DANBURY HOSPITAL
A Higher Level of Care

Folha de Informação aos Pacientes do Danbury Hospital

O que é uma Radiografia Contrastada do Intestino Delgado?

O que é uma radiografia contrastada do intestino delgado?

Uma radiografia contrastada do intestino delgado é um exame realizado para avaliar essa parte do intestino, também conhecido como duodeno. Esse exame é, com freqüência, utilizado para avaliar sintomas de dor abdominal ou diarréia.

Como devo me preparar para uma radiografia contrastada do intestino delgado?

- Pedirão para você não comer nem beber nada depois da meia-noite, na noite anterior ao seu exame. O seu médico lhe dará instruções específicas a serem seguidas.
- Pedirão para você retirar do corpo objetos com metal, tais como jóias, óculos e peças de roupa com zíperes ou fechos de metal que possam aparecer nas imagens, obscurecendo-as.
- Você deve programar-se para dedicar um período de até 4 horas para a realização do exame. O tempo de duração desse exame varia conforme o tempo que o bário levar para passar pelo intestino delgado.

Como é realizada uma radiografia contrastada do intestino delgado?

- O técnico em radiologia lhe solicitará um breve histórico de sua saúde.
- Você terá de ingerir pelo menos dois copos de bário. O bário é um líquido branco e espesso que revestirá os seus intestinos, tornando-os visíveis nas imagens de radiografia.



Fonte: National Digestive Diseases Clearinghouse através do site http://digestive.niddk.nih.gov

- Uma série de imagens do seu abdome serão tiradas à medida que o bário for passando pelo seu intestino delgado.
- Assim que o bário passar pelo intestino delgado,

entrando no cólon, o radiologista obterá imagens do intestino delgado com um aparelho de Raio-X conhecido como fluoroscópio.

- Pedirão para você ficar em várias posições diferentes, de forma que o radiologista possa visualizar porções diferentes do seu intestino delgado.
- Pode ser que o radiologista comprima o seu abdome para visualizar melhor certas porções do intestino delgado.

O que devo esperar depois do exame?

Por causa do bário, você evacuará fezes de cor esbranquiçada, durante alguns dias, depois do exame. Você deverá consumir mais líquidos do que o normal após o procedimento (a não ser que esteja sob restrição de líquidos) a fim de evitar prisão-de-ventre. Se você for propenso a ter prisão-de-ventre, converse com o médico sobre a possibilidade de tomar um laxante.

Uma radiografia contrastada do intestino delgado é algo seguro?

Durante esse procedimento, o aparelho de Raio-X produz um feixe de Raios-X que é cuidadosamente delimitado sobre a parte do corpo que estiver sendo examinada. Nenhuma radiação permanece no organismo depois do exame.

Observação Importante

No caso de pacientes do sexo feminino, se houver a menor possibilidade de você estar grávida, ou estiver amamentando, é importante avisar o técnico antes da radiografia.

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação a respeito da sua radiografia contrastada do intestino delgado, converse com o técnico em radiologia. Dentro de poucos dias, após o procedimento, um laudo será encaminhado ao seu médico, que conversará com você sobre os resultados.

05/2007