

O que é um Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) ou “Midline”?

O que são um Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC) e um Cateter “Midline”?

A sigla PICC significa, em inglês, Peripherally Inserted Central Venous Catheter (Cateter Venoso Central de Inserção Periférica). Trata-se de um cateter especial para infusão intravenosa, colocado em uma das veias perto da dobra do cotovelo ou na parte superior do braço. Depois de colocado, ele é introduzido até chegar na maior veia do corpo, localizada acima do coração, conhecida como veia cava. O cateter “Midline” (“de linha mediana”, em inglês) é semelhante ao cateter PICC, mas tem menor comprimento, sendo introduzido até chegar a uma veia grande na parte superior do braço.

Um cateter PICC ou “Midline” foi solicitado pelo seu médico para administrar-lhe medicamentos diretamente na veia (por via endovenosa). O cateter PICC e, em certas situações, o cateter “Midline”, também são utilizados como acesso para obter amostras de sangue. Um cateter PICC / “Midline” permite a administração dos medicamentos necessários, assim como a coleta de amostras de sangue, sem precisar perfurar o braço do paciente repetidas vezes com uma agulha.

Quem vai fazer a inserção do meu cateter PICC/“Midline”?

Normalmente, o cateter é instalado no leito hospitalar e inserido por uma Enfermeira (RN – Registered Nurse, ou seja, enfermeira com graduação superior) com a devida certificação para PICC. Ocasionalmente, pode vir a ser necessário que a inserção seja feita no Departamento de Radiologia Intervencional. Será tirada uma radiografia depois da inserção do cateter para verificar se ele está adequadamente posicionado.



O que devo esperar durante a inserção do cateter PICC / “Midline”?

- A Enfermeira esterilizará uma área de trabalho a fim de minimizar qualquer possibilidade de infecção. Durante o procedimento, a enfermeira estará usando bata, máscara, chapéu e luvas esterilizadas.
- Talvez você sinta uma pequena dor com a picada da agulha especial utilizada para a inserção do cateter, mas não deve sentir nada enquanto o tubo do cateter estiver sendo inserido na veia.
- O tempo de inserção de um cateter PICC/“Midline” varia. Esteja pronto(a) para uma demora de 30 a 60 minutos. Isso inclui o tempo de preparação.

Quais os cuidados que devo ter com o meu cateter PICC/“Midline”?

- Enquanto você estiver no hospital, uma Enfermeira (RN) com formação especial trocará os seus curativos e ficará monitorando o local da inserção para ter certeza de que não há nenhum problema.
- Se você receber alta com um cateter PICC/“Midline” no braço, serão tomadas providências para os devidos cuidados com o seu cateter como paciente de ambatório.

- Será necessário você manter o curativo limpo, seco e intacto. Ele se presta a duas importantes funções:
 - Proporcionar um ambiente livre de micróbios para o cateter;
 - Impedir a movimentação ou rompimento do cateter.
- Você receberá instruções especiais sobre como manter o seu curativo seco durante o banho, inclusive de chuveiro.
- Uma enfermeira trocará o curativo do seu cateter PICC uma vez por semana ou com mais frequência se for necessário.
- O cateter não deverá interferir em suas atividades normais, mas qualquer atividade que envolva fazer esforço físico, levantar muito peso ou executar movimentos repetitivos deve ser evitada.

CHAME IMEDIATAMENTE O SEU MÉDICO OU ENFERMEIRA SE VOCÊ PERCEBER:

- Muito sangramento ou corrimento no local de entrada do cateter no braço.
- Enrubescimento ou inchaço no local de entrada do cateter no braço.
- Dor, sensação dolorida ou inchaço no braço que tem o cateter.
- Dor ou desconforto no momento da colocação (infusão) dos líquidos da solução intravenosa no cateter.
- Dor ou desconforto no peito enquanto o cateter estiver inserido.
- Movimentação do cateter para dentro ou para fora do lugar no braço.
- Se sentir febre, calafrios ou fraqueza geral.
- Se você tiver um vazamento no cateter, ou se ele acidentalmente romper-se ou danificar-se, dobre e cole o cateter entre o local do rompimento ou vazamento e o

local de entrada do cateter no braço e chame o seu médico ou a enfermeira.

Quem vai fazer a remoção do meu cateter PICC/“Midline”

Quando a sua terapia estiver concluída, uma Enfermeira (RN) com certificação para PICC removerá o seu cateter. Isso pode ser feito antes de você sair do hospital ou como paciente de ambulatório.

A remoção do cateter PICC/“Midline”, de modo geral, é fácil e indolor. Depois que o cateter for removido, será aplicado um curativo estéril no local. Você poderá remover o curativo depois de 24 horas.

Não deixe de comunicar qualquer desconforto ou sinal de sangramento, contusão ou hematoma, enrubescimento, inchaço e/ou corrimento no local de onde o cateter foi removido.

Observações / Outras Informações:

Fonte:

BARD Access Systems

09/2007