DANBURY HOSPITAL
A Higher Level of Care

Folha de Informação aosPacientes do Danbury Hospital

O que é Mitomicina?

O que é mitomicina?

A mitomicina é um antibiótico antitumoral utilizado especificamente no tratamento de cânceres da bexiga e do reto. Também é utilizada no tratamento de câncer de mama, do estômago, pulmão, pâncreas e útero. Funciona ao impedir que o DNA da célula cancerígena se divida e passe a reproduzir-se ou multiplicar-se. Mitomicina C e Mutamicina são alguns dos outros nomes desse antibiótico.

Como é ministrada a mitomicina?

A mitomicina é um líquido transparente, de coloração roxa ou azul, ministrado por via endovenosa (na veia) ou instilado diretamente na bexiga através de um cateter urinário, conhecido como cateter de Foley.

É importante informar o seu médico sobre quaisquer problemas de saúde que você tiver. Também é importante informá-lo sobre quaisquer medicamentos que você estiver tomando para certificar-se de que não interfiram no resultado do seu tratamento.

Como devo me preparar para uma instilação da bexiga?

- Nenhum alimento sólido por via oral durante 6 horas antes do procedimento.
- Nenhum líquido por via oral durante 2 horas antes do procedimento.
- Um cateter de Foley será inserido na sua bexiga antes do procedimento para drenar toda a urina.

Como é realizado o procedimento?

- 30 a 60 mililitros de mitomicina serão instilados na bexiga e, então, o cateter de Foley será retirado.
- Pedirão para você reter a mitomicina na bexiga durante 2 horas, mudando de posição a cada 15 minutos, conforme descrito abaixo, a fim de cerficar-se de que o medicamento recobriu a parede interna da sua bexiga completamente.
  - Deite-se de costas, de bruços, do lado direito e, em seguida, do lado esquerdo.

Existe algum cuidado especial a ser tomado depois do procedimento?

- A não ser que haja contra-indicação, é importante consumir um volume maior de líquido durante várias horas após o tratamento. Procure consumir pelo menos doze copos comuns (8 onças ou 240 mililitros) de líquido por dia. Isso ajudará você a esvaziar a bexiga freqüentemente.
- Dê a descarga duas vezes depois de urinar, durante dois dias, e lave as mãos e a região genital cuidadosamente com sabonete e água. Se for possível, é recomendável tomar um banho de chuveiro ao chegar em casa para eliminar resíduos do medicamento que possam ter permanecido na região genital a fim de prevenir a irritação da pele.
- Durante pelo menos as primeiras 8 horas após o tratamento, você deve sentar-se na privada ao urinar, evitando, assim, respingos de urina na pele, os quais podem causar irritação por conta do medicamento.
- É possível que a sua urina fique de cor verde azulada a roxa. Isso já é esperado e pode durar até 2 dias depois de cada tratamento.
- É importante não expor outras pessoas a esse medicamento. Durante 2 dias após o tratamento, lave a sua roupa separada da roupa dos outros membros de sua família. Além disso, luvas de borracha devem ser usadas ao limpar a privada a fim de evitar a irritação da pele resultante de qualquer resíduo de urina e medicamento que possa ter respingado sobre a privada.

Existe algum efeito colateral do qual devo estar ciente?

Sintomas	O que fazer
• Irritação da bexiga; sangue na urina • Vontade freqüente de urinar; dor ao urinar	• Consuma bastantes líquidos • Relate ao seu médico qualquer hemorragia forte / sangue na urina
• Erupção ou irritação da pele	• Evite qualquer contato da pele com a urina; troque qualquer peça de roupa que entrar em contato com a urina • Lave as mãos e a região genital cuidadosamente com sabonete e água sempre depois de urinar

Fonte:

National Library of Medicine/MedlinePlus pelo site www.nlm.nih.gov

04/2008