DANBURY HOSPITAL
A Higher Level of Care

Folheto Informativo para Pacientes do Hospital de Danbury

Informações sobre Transfusão

O seu médico determinou que você precisa de uma transfusão de sangue e/ou componente sangüíneo como parte do plano do seu tratamento. O sangue do doador foi testado muito cuidadosamente. Ainda que extremamente raros existem riscos na transfusão. Os possíveis riscos incluem:

- Reação alérgica, como urticária
- Febre
- Infecção viral, como hepatite ou HIV
- Infecção bacteriana
- Hemólise, ou rápida destruição de células sangüíneas

Existe tratamento para todos esses possíveis efeitos colaterais.

À medida que testes mais específicos/sensíveis para essas doenças transmissíveis tornam-se disponíveis , os doadores ou unidades de doação podem ser testados novamente no futuro. Caso seja identificado que esses doadores possam ter sido infectantes, nós lhe comunicaremos.

Durante uma Transfusão

Durante a sua transfusão, os seus sinais vitais serão monitorados e você será observado atentamente quanto a sinais e sintomas de uma possível reação. Esses sintomas podem incluir:

- Calafrios ou febre
- Urticária
- Desmaios ou fraqueza
- Diarréia
- Falta de fôlego
- Náusea e vômitos
- Urina vermelha ou escura
- Dor no peito ou flanco (na região lombar ou renal)
- Dor ou desconforto no seu braço no local da punção da agulha ou acima

Se você se sentir mal ou apresentar qualquer dos sintomas acima, chame a sua enfermeira imediatamente, caso esteja no hospital. Se não estiver no hospital, chame seu médico ou dirija-se ao Departamento de Emergência local. O número de telefone do Departamento de Emergência do Hospital de Danbury é (203)739-7100.

Reações tardias podem ocorrer raramente meses após a transfusão. Quaisquer alterações na sua saúde geral, como cansaço anormal, alterações no apetite, perda de peso não planejada, urina escura ou vermelha, amarelecimento dos olhos ou pele (icterícia), glândulas inchadas ou muito suor noturno devem ser relatadas ao seu médico.