DANBURY HOSPITAL
A Higher Level of Care

Hoja educativa para el paciente del Danbury Hospital

Hoja informativa sobre transfusión

Su médico ha determinado que necesita una transfusión de sangre y/o hemoderivados como parte de su plan de tratamiento. La sangre del donante ha sido cuidadosamente analizada. Aunque es extremadamente excepcional, pueden existir riesgos con una transfusión. Los posibles riesgos incluyen:

- reacciones alérgicas, como ronchas
- fiebre
- infección viral, como hepatitis o VIH
- infección bacteriana
- hemólisis o destrucción rápida de las células sanguíneas

Hay tratamientos disponibles para todos estos tipos de efectos secundarios.

A medida que estén disponibles pruebas más específicas/sensibles para estas enfermedades transmisibles en el futuro, las unidades del donante o donantes serán analizadas nuevamente. En el caso de que se determine que estos donantes pueden haber estado infectados, se lo comunicaremos.

Durante una transfusión

Durante su transfusión, se controlarán sus signos vitales y se lo mantendrá bajo una observación cuidadosa en busca de signos y síntomas de una posible reacción. Estos síntomas pueden incluir:

- escalofríos o fiebre
- ronchas
- desmayos o mareos
- ruborización
- dificultad para respirar
- náuseas y vómitos
- orina de color rojo u oscura
- dolor en el pecho o en la zona lumbar (parte inferior de la espalda, zona de los riñones)
- dolor o molestias en su brazo o en o por encima del lugar de la inyección

Si se siente enfermo o experimenta alguno de los anteriores, llame a su enfermera de inmediato si se encuentra en el hospital. Si no se encuentra en el hospital, llame a su médico o vaya al departamento de emergencias local. El número de teléfono del departamento de emergencias del Danbury Hospital es (203) 739-7100.

En ocasiones excepcionales pueden ocurrir reacciones retardadas meses después de la transfusión. Debe informar a su médico de cualquier cambio en su salud general, tal como cansancio inusual, cambios en el apetito, pérdida de peso no planificada, orina oscura o roja, ojos o piel amarillenta (ictericia), ganglios inflamados o sudoración nocturna abundante.